

了解有關艾伯塔省麻疹的最新信息

2025 年 3 月 14 日 [媒體諮詢](#)

艾伯塔省政府要求居民了解麻疹症狀並取得資源保護自己，以防止麻疹進一步蔓延。

全球麻疹病例正在增加，許多國家和旅遊目的地報告出現疫情。加拿大多個省份都發現了病例，包括最近在艾伯塔省北部發現的疫情。

截至 3 月 13 日，衛生官員已確認本省有 6 例麻疹病例，雖然這些病例都來自同一家庭，但這確實使人們擔心這種高度傳染性疾病有可能進一步傳播。

麻疹是一種傳染性極強的疾病，容易透過空氣傳播。1970 年或以後出生的人，如果接種過的含麻疹成分的疫苗少於兩劑，容易受到感染。接種的含麻疹疫苗少於兩劑且懷孕、未滿一歲、成年人和/或免疫系統較弱的人患麻疹併發症的風險最大。

「麻疹不僅是一種輕微的兒童疾病，它是一種嚴重的、傳染性極強的疾病，可能帶來災難性的後果。值得慶幸的是，我們擁有一種高效疫苗，其安全性已得到長期驗證。每個人都應該花時間檢查自己的免疫接種記錄，以確保自己已經完全接種疫苗。這種疾病我們能夠預防，任何人都不該承受其後果。」

首席衛生官員馬克·喬夫博士

麻疹疫苗對預防感染和併發症非常有效。在艾伯塔省，透過艾伯塔省公共資助的免疫項目，符合資格的居民可免費接種麻疹疫苗。

如果確認出現麻疹症狀，建議個人待在家中，並在前往任何醫療機構或醫療服務提供者（包括家庭醫生診所或藥房）之前撥打健康熱線 811。

麻疹的症狀包括：

- 發燒 38.3° C 或更高
- 咳嗽、流鼻涕和/或眼睛發紅
- 發燒後三至七天出現紅色斑點狀皮疹，通常從耳後和臉部開始，然後蔓延至身體，最後到達手臂和腿部

如果艾伯塔省居民不確定自己或孩子的免疫接種史，可以編輯簡訊「vaccine record」發送至 88111，撥打健康熱線 811 或聯繫當地公共衛生辦公室。艾伯塔省居民還可以發送簡訊「measles」到 88111，麻疹健康訊息將發送到他們的行動裝置上。請聯絡您的初級保健提供者，以獲得最適合您的免疫接種建議。

有關常規兒童免疫接種的更多信息，請訪問ahs.ca/immunize。

有關麻疹疾病的更多信息，請訪問www.ahs.ca/measles。

速覽

- 麻疹之所以危險是因為：
 - 每 10 名麻疹患者中就有 1 人會罹患中耳感染或肺部感染。
 - 每 1,000 名麻疹患者中就有 1 人會罹患腦炎（腦腫脹），可能導致癲癇、耳聾或腦損傷。
 - 每1,000名麻疹患者中，會有1至3人死亡。
- 超過 90% 對麻疹沒有免疫力的人與病毒接觸後都會被感染。
- 艾伯塔省的兒童通常在 12 個月大時接種第一劑含麻疹的疫苗，並在 18 個月大時接種第二劑。接種兩劑疫苗的兒童被認為受到保護。
- 對於 1970 年或以後出生的成年人，如果沒有實驗室確診的疾病病史或沒有麻疹免疫的血清證據，則應有記錄證明一生中接種過兩次含麻疹疫苗，兩次接種間隔至少四周。
- 1970 年之前出生的成年人一般被認為對麻疹免疫，因為麻疹在 1970 年之前廣泛傳播。如果您是醫護人員、高等教育機構的學生或正在加拿大境外旅行，可能會建議您接種一劑或兩劑疫苗。

相關連結

- [免疫和疫苗](#)
- [了解麻疹](#)

媒體諮詢

安德魯·利文斯頓

587-545-7075

健康通訊負責人